

肺炎球菌結合型ワクチン

キャップボックス[®]を 接種される方へ



キャップボックス[®]は、季節に関わらず
接種することができます。

肺炎予防.jp


成人の肺炎予防に関するウェブサイト

<https://www.haien-yobou.jp/>



接種時に注意してください

過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は、前回接種したワクチンの種類や時期を医師に必ずお伝えください。



予防接種後に気を付けること

- 接種後しばらくは医療機関内で待機し、体調に変化がないことを確認してください¹⁾。
- 接種当日は、はげしい運動を避けてください^{2、3)}。
- ワクチンを接種した日にお風呂に入っても構いませんが、接種した部位をこすらないように注意しましょう^{2、3)}。
- キャップボックス®接種後、ほかの

種類のワクチンを接種する場合は接種の間に制限はありません⁴⁾。また、医師が必要と認めた場合は、ほかのワクチンとの同時接種ができます。

詳しくは医師にご相談ください。

- 接種後1週間は、体調に注意してください²⁾。

1)厚生労働省:よくある質問

Q6:予防接種を受ける前や受けた後には何に気をつければよいの?

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kihonteki_keikaku/index_00001.html#Q6

(2025年4月10日アクセス)

2)一般社団法人日本ワクチン産業協会:よぼうせつしゅのはなし 2024:2-3.

<http://www.wakutin.or.jp/popular/index.html> (2025年4月10日アクセス)

3)一般社団法人日本ワクチン産業協会:ワクチンについて

よ〜くわかる予防接種 Q副反応ってな〜に?

<http://www.wakutin.or.jp/data/mother/vaccination6.html> (2025年4月7日アクセス)

4)厚生労働省:ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/rota_index_00003.html (2025年4月10日アクセス)



キャップバックス®

肺炎球菌結合型ワクチン
接種記録カード

このカードはなくさないように、
大切に保管してください。



MSD製薬

INVENTING FOR LIFE

副反応

ワクチン接種後の主な副反応は、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れ、など)や、頭痛、筋肉痛、疲労、発熱などがあります¹⁾。

このほかにも接種後、気になることがあれば医師にご相談ください。

1) キャップボックス®筋注シリンジ電子添文 2025年8月作成(第1版)



MSD製薬

INVENTING FOR LIFE

MSD株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア

<https://www.msd.co.jp/>

2025年8月作成

CAP25PA0006



氏 名

接種日

年

月

日

Lot No.

医療機関名