Para aqueles que tomam os comprimidos combinados Idvynso®



Supervisão

Junichi Masuda

Vice-diretor de Farmácia, Departamento de Farmácia,
Centro Nacional de Saúde Global e Medicina,
Instituto Nacional de Gestão de Riscos à Saúde

Introdução

Este folheto destina-se a pessoas que tomam os comprimidos combinados Idvynso®, e fornece informações sobre como tomar, armazenar, o que fazer caso esqueça de tomá-los, os efeitos colaterais e precauções ao tomar.

Caso tenha alguma dúvida ou receio, consulte alguém da equipe médica como médicos, enfermeiros e farmacêuticos, para dar prosseguimento a um tratamento ainda melhor.

Supervisão **Junichi Masuda**

Vice-diretor de Farmácia, Departamento de Farmácia, Centro Nacional de Saúde Global e Medicina, Instituto Nacional de Gestão de Riscos à Saúde

CONTEÚDO

Introdução 1

O que é o comprimido combinado Idvynso® 2

Como tomar 3

Manuseio do comprimido e do frasco 4

Importância de tomar todos os dias 5

Porque tomar no horário definido? 6

Tomar junto com medicamentos ou alimentícios 7

Cuidados ao tomar 9

Quanto aos feitos colaterais 10

O que é o comprimido combinado Idvynso®

O comprimido combinado Idvynso® é um medicamento anti-HIV que contém 2 substâncias ativas

Islatravir + **Doravirina** ▶ **Comprimido combinado de Idvynso®**

Inibidores da translocação da transcriptase reversa de nucleosídeos

Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos

Nos últimos anos, houve grandes avanços no tratamento da infecção pelo HIV, e vários medicamentos foram desenvolvidos para suprimir a proliferação do vírus no organismo.

Com o tratamento adequado e contínuo, os pacientes agora conseguem levar uma vida diária quase igual à das pessoas que não estão infectadas.

Atualmente, o tratamento básico mais utilizado é uma combinação de 2 ou 3 substâncias ativas.

Os comprimidos combinados Idvynso® são um dos medicamentos utilizados neste tratamento e é um medicamento anti-HIV tomado uma vez por dia, contendo duas substâncias ativas, islatravir e doravirina.




Como tomar

O comprimido combinado Idvynso®

- Toma-se 1 comprimido, 1 vez a cada 1 dia

Foto do medicamento



- Pode ser tomado independentemente das refeições



Manuseio do comprimido e do frasco

Um frasco contém 30 comprimidos combinados Idvynso® (para 30 dias)

Modo de abrir a tampa


1. Enquanto pressiona a tampa para baixo,
2. Gire e abra no sentido anti-horário.



Dessecante

No frasco incluem-se 4 unidades de dessecantes.

Atenção: Cuidado para não ingerir o dessecante equivocadamente



Modo de armazenagem

Feche a tampa e armazene o frasco na temperatura ambiente.
Para evitar a umidade, mantenha o dessecante dentro.

Importância de tomar todos os dias

1 Tome todos os dias no horário definido, sem se esquecer

Para não se esquecer, defina um horário dentro do seu estilo de vida, que seja "um horário difícil de esquecer de tomar", para que tome todos os dias no mesmo horário.

Ex;
- De manhã, logo após acordar
- De tarde, às 18 horas
- De noite antes de dormir, e afins



Ainda, empenhe-se para não se esquecer de tomar.

Ex;
- Aplicativos de medicamento
- Alarme do smartphone
- Caderneta de medicação, e afins

2 Caso se esqueça de tomar

- Caso tenha passado menos de 12 horas do horário programado, tome uma dose (um comprimido) nesse horário e, em seguida, retome o seu cronograma de medicação regular.

- Caso tenha passado mais de 12 horas do horário programado, pule a vez e tome uma dose (um comprimido) no próximo horário. Não tome duas doses de uma só vez.


3 Não interrompa o medicamento por decisão própria, nem altere a dosagem.

Não interrompa a medicação devido ao receio dos efeitos colaterais, nem altere a dosagem. Não decida por si próprio, tome segundo as instruções do médico.

Por que tomar no horário definido?

Se os medicamentos anti-HIV forem tomados diariamente, no mesmo horário e na dose prescrita, é possível manter a concentração deste no sangue que suprimem a proliferação do vírus.

Ilustração: Mudança da concentração de medicamento no sangue ao tomar 1 vez a cada dia, de manhã (Ex.)




Interações com medicamentos ou alimentícios


Caso esteja tomando outros medicamentos ou inicie a tomar, consulte o médico ou farmacêutico

- Tenha cuidado com as interações medicamentosas*. Dependendo da interação medicamentosa, a concentração sanguínea dos medicamentos antirretrovirais pode diminuir, o que pode levar à proliferação do vírus no organismo ou ao desenvolvimento de vírus resistentes. Também pode aumentar a concentração sanguínea dos medicamentos antirretrovirais, o que pode causar efeitos colaterais.

- Se você pretende ir a outro hospital ou comprar medicamentos sem receita, suplementos ou alimentos saudáveis, certifique-se de consultar seu médico ou farmacêutico com antecedência.



Medicamentos de farmácia



Medicamentos de prescrição de outros hospitais



Suprimentos, produtos alimentícios saudáveis e afins

*As interações medicamentosas ocorrem quando vários medicamentos são tomados juntos, fazendo com que um medicamento tenha um efeito mais forte ou mais fraco.

Não se deve tomar junto com os medicamentos abaixo

- Anticonvulsivantes
  (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína)
- Agentes para tratamento do câncer de próstata
  (enzalutamida, apalutamida)
- Medicamentos antimicobacterianos (rifampicina)
- Agentes para quimioterapia de câncer adrenal /
  Agentes inibidores da síntese de corticosteroides adrenais (mitotano)
- Agente antineoplásico [inibidor de IDH1] (ivosidenibe)
- Agente antineoplásico [inibidor de BRAF] (encorafenibe)
- Medicamentos anti-HIV (lamivudina, emtricitabina)
- Alimentos que contenham Hypericum perforatum (Erva-de-são-joão)



Utilize as cadernetas de medicamento, solicitando a verificação dos remédios que está tomando

Cuidados ao tomar

Aqueles que se incluem nos abaixo, consulte o médico ou farmacêutico

1. Pessoas com insuficiência renal grave
2. Pessoas com insuficiência hepática grave
3. Mulheres que estão ou que possam estar grávidas
4. Mulheres que estão amamentando
5. Crianças



Quanto aos efeitos colaterais

Atenção aos sintomas abaixo

Ao tomar este medicamento, você pode sentir dor de cabeça, tontura, diarreia, distensão abdominal, letargia (fadiga) e afins. Caso note qualquer alteração no seu estado físico, entre em contato com seu médico, enfermeiro ou farmacêutico imediatamente.



Quando houver receio ao tomar, consulte de imediato um profissional da saúde

Havendo alguma dúvida ou preocupação sobre como tomar o seu medicamento, mesmo que não esteja relacionado com alterações no seu estado físico, consulte imediatamente um médico, enfermeiro ou farmacêutico, sem tomar qualquer decisão por conta própria.



Para a edição eletrônica desta brochura, escaneie este código.

Nome do Hospital

2026年9月作成
IDV26PA0151