

ラゲブリオ[®]カプセル200mgを
服用する患者さん・ご家族の方へ

ラゲブリオ®カプセル200mgとは

この薬は、新型コロナウイルス感染症の治療薬です。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)

の増殖を阻害することで、抗ウイルス

効果を示すお薬です。



数字やマークが記載されていない
カプセルもあります



1ボトル(40カプセル入り)が、
一人分となっています。

ラゲブリオ®のボトル開閉方法と保管方法

開閉方法

- 誤開封を防ぐ仕組みのため、①ボトルキャップを押しながら②左に回すと開きます。
- キャップを閉める際、押したり、過度に力を入れて回さないでください。
(※キャップを開けにくくなる恐れがあります)

キャップの開け方



保管方法

- キャップを閉めて、ボトルのまま保管してください。
- 直射日光と湿気を避けて室温(1~30°C)で保管してください。
- 子どもの手の届かないところに保管してください。

ボトルの開け方・閉め方を動画でも紹介しています。
こちらの二次元コードよりアクセスしてください。



ラゲブリオ®の服用方法

1回4カプセルを
1日2回、5日間
服用してください。

1回 4カプセル



※コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。

1日2回 5日間



1日目



2日目



3日目



4日目



5日目

- ラゲブリオ®は食事の有無にかかわらず服用できます。
- 症状が発現してから速やかに服用し、症状がよくなっても自己判断せずに5日間飲み切ってください。

発症後速やかに服用することで、効果を発揮します。

新型コロナウイルスは発症日には体内的ウイルス量がピークに達しています。

重症化してしまうのを防いだり、他人への感染リスクを減らすためにも、新型コロナウイルス感染症の症状が発現したら速やかに診断を受け、診断後速やかにラゲブリオ®の服用を開始することが重要になります。

飲み忘れてしまったら

決して2回分を1度に服用しないでください。

■ 飲み忘れに気がついた時に、1回分を服用してください。



■ ただし、次の服用時間が近い場合(2時間を目安)は1回分をとばして、次の服用時間に1回分を服用してください。



薬が残ってしまったら

万が一、薬が残ってしまった場合でも、絶対に他の人に譲らないでください。

- 症状がよくなった場合でも5日間飲み切ってください。
- 残った薬は保管せず、患者さん自身で廃棄又は薬剤師にお渡しください。

絶対に他の人に渡してはいけません。



ラゲブリオ[®]の服用前にご確認ください

次に該当する場合は、ラゲブリオ[®]を使用できません。

- 過去にラゲブリオ[®]カプセルに含まれる成分で過敏症のあった人
- 妊婦または妊娠している可能性がある人

次に該当する場合は、ラゲブリオ[®]の使用に注意が必要です。ラゲブリオ[®]を使い始める前に、医師または薬剤師にお申し出ください。

- 授乳中の人

妊娠している女性

妊娠している可能性のある女性は、
ラゲブリオ[®]を使用できません。

- 現在、妊娠中又は妊娠している可能性がある場合には、ラゲブリオ[®]を服用できません。少しでも可能性がある場合は、必ず担当の医師、看護師または薬剤師にお伝えください。
一前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があります。避妊をしていても妊娠していないとは限りません。
一妊娠初期の妊婦では、妊娠検査で陰性を示す場合があります。
- 妊娠する可能性のある女性は、ラゲブリオ[®]の服用中～服用終了後4日間に性交渉を行う場合は、パートナーと共に適切な避妊を行ってください。
- ラゲブリオ[®]を服用中～服用終了後4日間に妊娠した、あるいは妊娠していることがわかった場合は、直ちに医師、看護師または薬剤師に相談してください。

ラゲブリオ®の副作用

重大な副作用

アナフィラキシー(頻度不明)

主な自覚症状: 全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸(どうき)、息苦しい

その他の主な副作用

下痢、恶心、浮動性めまい、嘔吐、頭痛、発疹、じんま疹、中毒性皮疹、紅斑、血管性浮腫

まだ知られていない副作用やリスクがあるかもしれません。これまでに報告されていない症状・疾患が現れる可能性もあります。異常を感じた場合には、医師、看護師または薬剤師にご相談ください。

経過と服薬の記録

記入例

体温	記入日		月 日		月 日		月 日		月 日	
	発症後	XX 日目	日目		日目		日目		日目	
ラゲブリオ®服用	○ ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
測定時間	7:30 20:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:
測定体温	38.5 38.9									
41°C										
40°C										
39°C										
38°C										
37°C										
36°C										

症状 など	気になる症状 など	頭が痛い		咳がひどい		食欲はある					



体調の変化以外でも、
お薬の服用方法でわからないことや
心配なことがあれば
ご自分で判断せずに
医師、看護師または薬剤師に
すぐに相談してください。

新型コロナウイルス感染症を発症した日 月 日

1日2回、
5日間続けて
服用してください。

ラゲブリオ®の服用を開始した日 月 日

医療機関名

ラゲブリオ[®]を服用される患者さんに、服用方法、服用の際の注意点などを掲載したWebサイトをご用意しております。



こちらからアクセスしてください。

[https://www.msd.co.jp/healthcare/
medicine-product-list/lagevrio/](https://www.msd.co.jp/healthcare/medicine-product-list/lagevrio/)



MSD株式会社