**患者向医薬品ガイド**

2025 年 6 月作成

# エアウィン皮下注用 45mg
# エアウィン皮下注用 60mg

## 【この薬は？】

| | | |
|---|---|---|
| 販売名 | エアウィン皮下注用 45mg<br>AIRWIN for Subcutaneous Injection 45mg | エアウィン皮下注用 60mg<br>AIRWIN for Subcutaneous Injection 60mg |
| 一般名 | ソタテルセプト（遺伝子組換え）<br>Sotatercept (Genetical Recombination) | |
| 含有量 | 45mg<br>（1 バイアル中 55mg） | 60mg<br>（1 バイアル中 72.5mg） |

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

・この薬は、肺高血圧症治療薬で、アクチビンシグナル伝達の阻害を治療標的とした注射薬です。
・この薬は、肺の血管壁での異常な細胞増殖を抑える働きがあります。
・次の病気の人に処方されます。

**肺動脈性肺高血圧症**

・この薬は肺血管拡張薬による治療を受けている人に使用が検討されます。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

〇次の人は、この薬を使用することはできません。

・過去にエアウィン皮下注用に含まれる成分で過敏症のあった人
・この薬の投与開始前の血小板数が 50,000/$mm^3$ 未満の人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
・赤血球増加症の人
・出血しやすい人［血小板凝集抑制作用を有する薬剤もしくは抗凝固薬を投与されている人または血小板数が低値の人］
・妊婦または妊娠している可能性のある人
・授乳中の人

○ヘモグロビン増加および血小板減少症があらわれることがあるので、ヘモグロビン値および血小板数の確認のため、この薬の投与開始前に血液検査が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

**●使用量および回数**

・使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。
・通常、成人の使用する量および回数は、次のとおりです。

| | 初回用量 | 維持用量 |
|---|---|---|
| 一回量 | 体重 1kg あたり 0.3mg | 体重 1kg あたり 0.7mg |
| 使用回数 | ３週間ごとに皮下投与する | |

・症状または血液検査等により、この薬の増量、休薬または中止が判断されます。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・ヘモグロビン増加および血小板減少症があらわれることがあるので、ヘモグロビン値および血小板数の確認のため、投与中は定期的に血液検査が行われます。
・低酸素症があらわれた場合、原因精査のための検査が行われることがあります。
・妊婦または妊娠している可能性のある人は、医師からこの薬が胎児に影響を及ぼす可能性について説明を受け、十分に理解してください。
・妊娠する可能性がある女性は、この薬を使用している間および使用終了から４ヵ月間は適切な避妊を行ってください。医師からこの薬が受胎能に影響を及ぼす可能性について説明を受け、十分に理解してください。
・授乳している人は、この薬を使用している間および使用終了から４ヵ月間は授乳を避けてください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|---|---|
| 出血<br>しゅっけつ | 出血<br>**〔後腹膜血腫（こうふくまくけっしゅ）の場合〕**<br>腹痛、背中の痛み<br>**〔胃腸出血（いちょうしゅっけつ）の場合〕**<br>吐き気、嘔吐（おうと）、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、腹痛、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色） |
| 血小板減少症、血小板数減少<br>けっしょうばんげんしょうしょう、けっしょうばんすうげんしょう | 鼻血、唾液・痰に血が混じる、血を吐く、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい |
| 赤血球増加症<br>せっけっきゅうぞうかしょう | **〔血栓塞栓症（けっせんそくせんしょう）の場合〕**<br>吐き気、嘔吐、脱力、まひ、激しい頭痛、胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、激しい腹痛、お腹が張る、足の激しい痛み<br>**〔過粘稠度症候群（かねんちゅうどしょうこうぐん）の場合〕**<br>息切れ、頭痛、めまい、注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

| 部位 | 自覚症状 |
|---|---|
| 全身 | 出血、出血が止まりにくい、脱力、まひ |
| 頭部 | 激しい頭痛、頭痛、めまい、注意力が散漫になる、問いかけに間違った答えをする、行動にまとまりがない |
| 顔面 | 鼻血 |
| 口や喉 | 吐き気、嘔吐、吐いた物に血が混じる（赤色～茶褐色または黒褐色）、唾液、痰に血が混じる、血を吐く、歯ぐきからの出血 |
| 胸部 | 胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、息切れ |
| 腹部 | 腹痛、激しい腹痛、お腹が張る |
| 背中 | 背中の痛み |
| 手・足 | 足の激しい痛み |
| 皮膚 | あおあざができる |
| 便 | 便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色） |

## 【この薬の形は？】

| 販売名 | エアウィン皮下注用 45mg | エアウィン皮下注用 60mg |
|---|---|---|
| 形状 | | |
| 性状 | 白色の塊または粉末 | |

## 【この薬に含まれているのは？】

| 販売名 | エアウィン皮下注用 45mg | エアウィン皮下注用 60mg |
|---|---|---|
| 有効成分 | ソタテルセプト（遺伝子組換え） | |
| 添加剤 | クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ポリソルベート 80、精製白糖 | |

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD 株式会社（https://www.msd.co.jp）

MSD カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9:00～17:30

（土日祝日・製造販売会社休日を除く）