

# Para quem consome ISENTRESS® 600mg

Supervisão: Doutor Shinichi Oka

[Diretor Emérito do Centro Clínico de AIDS (ACC), Centro Nacional para Saúde e Medicina Global]



# Introdução


Este guia apresenta as características e o modo de consumo dos comprimidos ISENTRESS® 600mg, assim como as medidas a seguir caso se esqueça de tomar o medicamento e dicas para o seu uso correto.

Leia antes de consumir.

Caso tenha alguma dúvida em relação ao tratamento ou aos comprimidos, consulte o seu médico e outros profissionais de saúde.

Supervisão: Doutor Shinichi Oka

[Diretor Emérito do Centro Clínico de AIDS (ACC),  
Centro Nacional para Saúde e Medicina Global]



# Índice

<b><u>Introdução</u></b> .....	2
--------------------------------	---

## **Apresentação do ISENTRESS® 600mg**

● Como funciona .....	4
● Como usar .....	4
● Caso se esqueça de tomar .....	4
● Consumo juntamente com outros medicamentos .....	5
● Consumo durante a gravidez e amamentação .....	5
● Reações adversas .....	5

<b><u>Para usar ISENTRESS® 600mg corretamente</u></b> .....	6~7
---	-----

<b><u>Sobre a infecção por VIH e o seu tratamento</u></b> .....	8~9
---	-----

<b><u>Outras informações sobre a dosagem</u></b> .....	10
--	----

# Apresentação do ISENTRESS® 600mg

## Como funciona

ISENTRESS® 600mg é um tipo de medicamento inibidor da integrase.



Nome do produto: ISENTRESS® 600mg  
Ingredientes: Potássio de Raltegravir

## Como usar

Consuma **dois comprimidos** de ISENTRESS® 600mg **uma vez por dia**. Pode ser utilizado quando quiser, **independentemente da refeição**.

Consuma quando quiser, antes ou depois da refeição ou de estômago vazio.

Defina a hora de consumo conforme o seu padrão de vida para que o uso do medicamento se torne um hábito.

## Caso se esqueça de tomar

Assim que se aperceba, consuma a dose equivalente a uma vez.

Caso a próxima hora de consumo esteja próxima, não tome o medicamento imediatamente. Espere pela hora definida e consuma a quantidade equivalente a uma vez.

Nunca administre quantidades equivalentes a duas vezes (4 comprimidos) ao mesmo tempo.



## **Consumo juntamente com outros medicamentos**

Caso haja outros medicamentos ou suplementos que toma regularmente, informe o seu médico e farmacêutico.

Existem medicamentos que requerem atenção caso sejam utilizados juntamente com ISENTRESS® 600mg.

## **Consumo durante a gravidez e amamentação**

Caso esteja grávida ou planeie engravidar, consulte o médico.

Durante o consumo de ISENTRESS® 600mg, evite amamentar.

## **Reações adversas**

As principais reações adversas poderão ser náusea, dor abdominal, dor de cabeça, diarreia, vômito, tontura, etc.

Caso sinta qualquer alteração física, consulte imediatamente o seu médico, farmacêutico ou outros profissionais de saúde.

# Para usar ISENTRESS® 600mg corretamente

**Para manter a eficácia do medicamento, acostume-se ao seu uso correto.**

No tratamento, é essencial tomar os medicamentos regularmente todos os dias. Tenha sempre em mente os seguintes cuidados durante o consumo.

## Cuidados durante o consumo

1

### **Incorpore o uso diário como um hábito do dia-a-dia.**

Defina a hora de consumo conforme o seu padrão de vida, para que não se esqueça de tomar o medicamento. É preferível incorporar o uso como um hábito diário, por exemplo, antes de pequeno almoço, antes de dormir ou outros momentos.



2

### **Mesmo se os valores laboratoriais ou os sintomas melhorarem, não interrompa o consumo nem mude a quantidade de dosagem por conta própria.**


Caso pare a utilização ou mude a quantidade de dosagem por conta própria, a quantidade de vírus aumentará ou o medicamento deixará de ser eficaz. Continue o uso correto segundo as instruções do médico.

Vou tomar todos os dias, mesmo se os sintomas aliviam!



# 3

**Caso surja qualquer sintoma notável, consulte imediatamente o seu médico, farmacêutico ou enfermeiros.**



Além de qualquer sintoma que possa surgir, caso tenha alguma dúvida ou preocupação em relação à administração do medicamento, consulte qualquer farmacêutico, enfermeiro ou outros profissionais de saúde.

**Para quem tenha consumido ISENTRESS® 400mg**

**Não utilize ISENTRESS® 400mg em vez de ISENTRESS® 600mg.**

Embora ISENTRESS® 600mg e ISENTRESS® 400mg tenham os mesmos ingredientes ativos, a rapidez e a quantidade de absorção são desiguais.

Caso ainda possua ISENTRESS® 400mg, nunca tome este como uma alternativa a ISENTRESS® 600mg.


A eficácia do medicamento não será igual.

# Sobre a infecção por VIH e o seu tratamento

Quando infectados pelo VIH, as células imunitárias são destruídas pelo vírus e a imunidade é reduzida.


Sem tratamento adequado após a infecção por VIH, as células CD4 (células imunitárias) serão gradualmente destruídas. Quando a destruição das células CD4 for avançada, a imunidade será reduzida, levando a que o corpo seja facilmente infectado pelos patógenos que normalmente poderia rejeitar, desenvolvendo assim as várias doenças. Esta condição doentia é chamada de SIDA.

## Curso natural da infecção por VIH



## Em virtude do tratamento por medicamentos anti-VIH, reduz-se a quantidade de vírus e recupera-se a imunidade.

O tratamento baseia-se no consumo de medicamentos anti-VIH. Eles inibem a reprodução do vírus e reduzem a sua quantidade. Quando o número de vírus for reduzido, o número de células CD4 aumenta e a imunidade é recuperada.



## Utilizar uma combinação de medicamentos de diferentes mecanismos de ação.

Existem diversos tipos de medicamentos anti-VIH conforme diferentes mecanismos de ação.

No tratamento, utiliza-se uma combinação de alguns medicamentos de diferentes mecanismos de ação.

### Tipos principais de medicamentos anti-VIH

- Inibidor da integrase
- Inibidor da protease
- Inibidor não-nucleosídeo da transcriptase reversa
- Inibidor nucleosídeo da transcriptase reversa

# Outras informações sobre a dosagem

## Como abrir

Para abrir o recipiente de ISENTRESS® 600mg, pressione e rode a tampa como mostrado abaixo.

### Instrução para abrir

- ① Pressione a parte superior da tampa.
- ② Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



## Websites de informações sobre VIH

Consulte as seguintes páginas para saber mais sobre a infeção por VIH, o seu medicamento, tratamento, etc.

- Centro Clínico de AIDS, Centro Nacional para Saúde e Medicina Global  
<https://www.acc.ncgm.go.jp>
- Organização Hospitalar Nacional, Hospital Nacional de Osaka, Centro de Desenvolvimento Médico Avançado de HIV/AIDS  
<https://osaka.hosp.go.jp/department/khac/index.html>
- Rede de Informações de Prevenção de AIDS  
<https://api-net.jfap.or.jp>





●Nome do hospital