ワクチン接種を受ける人へのガイド

2025年10月更新

肺炎球菌ワクチン

【このワクチンの名前は?】

販売名	ニューモバックスNPシリンジ PNEUMOVAX NP Syringes
一般名	肺炎球菌ワクチン
	Pneumococcal vaccine

ワクチン接種を受ける人へのガイドについて

ワクチンの正しい理解と、重大な副反応の早期発見などに役立てていただくために、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、特に知っていただきたいことをわかりやすく記載しています。添付文書情報はPMDAホームページ「医薬品に関する情報」https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に掲載されています。 ※副反応:ワクチンの副作用のこと

【このワクチンの効果は?】

- このワクチンは、次の目的で接種されます。
 - 2歳以上で肺炎球菌による重篤疾患に罹患する危険が高い次のような個人 及び患者
 - 1. 脾摘した人における肺炎球菌による感染症の発症予防
 - 2. 肺炎球菌による感染症の予防
 - 1) 鎌状赤血球疾患、あるいはその他の原因で脾機能不全である患者
 - 2) 心・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等 の基礎疾患のある患者
 - 3) 高齢者
 - 4) 免疫抑制作用を有する治療が予定されている人で治療開始まで少なくとも 14 日以上の余裕のある患者
- ・ このワクチンの接種により23種類の肺炎球菌に対する抗体ができ、これ らの種類の肺炎球菌による感染症を予防します。

【このワクチンの接種前に、確認すべきことは?】

- ワクチン接種を受ける人または家族の方などは、このワクチンの効果や副反 応などの注意すべき点について十分理解できるまで説明を受けてください。 説明に同意した上で接種を受けてください。
- 医師が問診、検温および診察の結果から、接種できるかどうか判断します。
- 次の人は、このワクチンの接種を受けることはできません。
 - 2歳未満の人
 - 明らかに発熱(通常37.5℃以上)している人
 - ・ 重篤な急性疾患にかかっている人
 - ・ 過去にこのワクチンに含まれる成分でアナフィラキシーをおこしたことが ある人
 - ・ 上記以外に医師が予防接種を行うことが不適当な状態にあると判断した人
- 次の人は、医師が健康状態や体質に基づいて、接種の適否を判断します。
 - ・ 心臓や血管、腎臓、肝臓、血液の障害や発育の障害などの基礎疾患がある人
 - ・他のワクチンの接種を受けて、2日以内に発熱があった人や全身性の発疹 などアレルギーが疑われる症状が出たことがある人
 - 過去にけいれんをおこしたことがある人
 - 過去に免疫に異常があると診断されたことがある人や両親や兄弟に先天性 免疫不全症の人がいる人。
 - このワクチンの成分に対してアレルギーをおこすおそれがある人
 - ・ 過去にこのワクチンを接種したことのある人(【このワクチンの接種後に 気をつけなければならないことは?】の項をご参照ください。)
 - ・ 腎臓に障害がある人
 - ・ 肝臓に障害がある人
 - 妊婦または妊娠している可能性のある人
 - 高齢の人
- 妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- 併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用 する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【このワクチンの接種スケジュールは?】

● 接種量および回数

1回0.5mLを筋肉または皮下に注射します。

「定期接種ⁱ]

これまでにこのワクチンを1回も接種したことがなく、以下のどちらかに当てはまる人が定期接種として1回接種できます。

- ① 65歳の人(ただし、②に当てはまる人として既に定期接種を受けたことがある人は、①の対象者から除く)
- ② 60歳から64歳の人のうち次の人
 - ・ 心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制 限されている人
 - ・ ヒト免疫不全ウイルス (HIV) により免疫機能に障害があり、日常 生活がほとんど不可能な人

このタイミングで、接種を受けられなかった場合は医師に相談してください。

「任意接種ⁱⁱ]

・ 希望される場合には医師に相談してください。

i 定期接種:予防接種法で定められた予防接種を、定められた年齢で受ける場合 ii 任意接種:予防接種法で定められていない予防接種や、定期接種で定められた年 齢から外れて受ける場合

○ 医師が必要と認めた場合には、同時に他のワクチンの接種を受けることができます。

【このワクチンの接種後に気をつけなければならないことは?】

- ・ 接種当日は激しい運動をしないでください。また、接種部位を清潔に保 ち、接種後の健康状態によく気をつけてください。接種部位の異常や体調 の変化、さらに高熱やけいれんなどの異常な症状があらわれた場合は、す ぐに医師の診察を受けてください。
- ・ 過去5年以内にこのワクチンの接種を受けたことのある人が、再接種を受けると、以前の接種時より注射部位に痛み、赤い発疹、しこり等の副反応

が高い頻度や強い程度であらわれると報告されています。再接種を行う場合は、その必要性を医師と相談のうえ、十分な間隔をあけて受けてください。

- ・接種後に、アナフィラキシー(全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸(どうき)、息苦しいなど)がおこることがあります。アナフィラキシーは通常接種後30分以内におこることが多いので、この間接種施設で待機するか、すぐに医師と連絡をとれるようにしておいてください。
- ・ 他の医師を受診したり、他のワクチンを接種したりする場合は、必ずこの ワクチンを接種したことを医師、薬剤師または看護師に伝えてください。

副反応は?

特にご注意いただきたい重大な副反応と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副反応であれば、それぞれの重大な副反応ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師に相談してください。

重大な副反応	主な自覚症状
アナフィラキシー様反	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつ
応	き、動悸、息苦しい
アナフィラキシーようはんのう	
血小板減少	鼻血、唾液・痰に血が混じる、血を吐く、歯ぐき
けっしょうばんげんしょう	からの出血、あおあざができる、出血が止まりに
	< v >
知覚異常	ピリピリ感、ムズムズ感
ちかくいじょう	
ギランバレー症候群	両側の手や足に力が入らない、歩行時につまず
ぎらんばれーしょうこうぐん	く、階段を昇れない、物がつかみづらい、物が二
	重に見える、手足の感覚が鈍くなる、顔の筋肉が
	まひする、食べ物が飲み込みにくい、呼吸が苦し
	V
蜂巣炎・蜂巣炎様反応	皮膚の痛みと熱を伴った赤いはれ、発熱、寒気、
ほうそうえん・ほうそうえんようは	黒褐色調の変色、注射した部位のびらん・潰瘍形
んのう	成
注射部位壊死、注射部	

以上の自覚症状を、副反応のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副反応ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	ふらつき、出血が止まりにくい、発熱、寒気
顔面	鼻血、顔の筋肉がまひする
眼	物が二重に見える
口や喉	喉のかゆみ、唾液・痰に血が混じる、血を吐く、歯
	ぐきからの出血、食べ物が飲み込みにくい
胸部	動悸、息苦しい、呼吸が苦しい
手・足	両側の手や足に力が入らない、歩行時につまずく、
	物がつかみづらい、手足の感覚が鈍くなる
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹、あおあざができる、ピリ
	ピリ感、皮膚の痛みと熱を伴った赤いはれ、黒褐色
	調の変色、注射した部位のびらん・潰瘍形成
筋肉	階段を昇れない
その他	ムズムズ感

【このワクチンの形は?】



写真はほぼ原寸大です。

【このワクチンに含まれているのは?】

	肺炎球菌きょう膜ポリサッカライド
	1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V,
有効成分	10A、11A、12F、14、15B、17F、
	18C, 19A, 19F, 20A, 22F, 23F,
	3 3 F
添加剤	フェノール、塩化ナトリウム

【このワクチンについてのお問い合わせ先は?】

- ・ 症状、使用方法、副反応などのより詳しい質問がある場合は、医師や薬剤 師、看護師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社:MSD株式会社

(https://www.msd.co.jp)

MSDカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル: 0120-024-964

受付時間:9:00~17:30

(土日祝日・製造販売会社休日を除く)