

患者向医薬品ガイド

2023年8月更新

プレバイミス点滴静注 240mg

【この薬は?】

販売名	プレバイミス点滴静注 240mg PREVYMIS Intravenous Infusion 240mg
一般名	レテルモビル Letermovir
含有量/容量 (1 バイアル中)	240mg/12mL

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知りたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は?】

- ・この薬は、抗サイトメガロウイルス化学療法剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、サイトメガロウイルスの増殖に必要なウイルスのたんぱく質 (DNA ターミナーゼ複合体) を阻害して抗ウイルス作用を示します。
- ・次の目的で処方されます。

同種造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にこの薬に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・次の薬を使用している人

ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、メチルエルゴメトリン、エルゴメトリン

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・腎臓に中等度以上の障害がある人
- ・肝臓に重い障害がある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の

○この薬には併用してはいけない薬〔ピモジド（オーラップ）、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン配合錠）、ジヒドロエルゴタミン、メチルエルゴメトリン（パルタンM）、エルゴメトリン〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。

通常、成人では、1日1回約60分かけて点滴します。

移植当日から移植後28日以内を目安に開始し、使用期間は、サイトメガロウイルス感染症の発症リスクを考慮しながら、移植後200日目まで使用することが目安となります。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・腎臓に中等度以上の障害がある人や長期間にわたりこの注射薬を継続して使用者には、腎臓の障害の悪化等を引き起こしていないか確認するため、定期的に腎機能検査が行われます。

・妊娠する可能性のある人は胎児に悪影響を及ぼす可能性があることを十分理解できるまで説明を受けるとともに、使用中および使用終了後一定期間は適切な避妊をしてください。

・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。

・授乳している人は医師に相談してください。

・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

性状	無色透明の液
形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	レテルモビル
添加剤	ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン 1800mg

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などにより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD 株式会社 (<https://www.msd.co.jp>)

MSD カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9:00～17:30

(土日祝日・製造販売会社休日を除く)