

プレバイミス錠 240mg
プレバイミス顆粒分包 20mg
プレバイミス顆粒分包 120mg

【この薬は？】

販売名	プレバイミス錠 240mg PREVYMIS Tablets 240mg	プレバイミス顆粒分包 20mg PREVYMIS Granules 20mg	プレバイミス顆粒分包 120mg PREVYMIS Granules 120mg
一般名	レテルモビル Letermovir		
含有量	240mg (1 錠中)	20mg (1 包中)	120mg (1 包中)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗サイトメガロウイルス化学療法剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、サイトメガロウイルスの増殖に必要なウイルスのたんぱく質（DNAターミナーゼ複合体）を阻害して抗ウイルス作用を示します。
- ・次の目的で処方されます。

下記におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制

○同種造血幹細胞移植

○臓器移植

- ・臓器移植において、腎移植以外の臓器移植患者さんを対象とした有効性及び安全性を評価する臨床試験は実施していません。
- ・この薬は、自己判断で使用を中止したり量を加減したりすると、本来の効果が得られないおそれがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にこの薬に含まれる成分で過敏症のあった人
 - ・次の薬を使用している人
ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、メチルエルゴメトリン、エルゴメトリン
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・肝臓に重い障害がある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬〔ピモジド（オーラップ）、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン配合錠）、ジヒドロエルゴタミン、メチルエルゴメトリン（パルタンM）、エルゴメトリン〕や、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの体重や症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人および小児の飲む量と回数は、次のとおりです。

〔成人〕

1 回量 (錠数または包数)	240mg 錠 2 錠または 120mg 顆粒 4 包
	シクロスポリン（免疫抑制剤）と併用する場合： 240mg 錠 1 錠または 120mg 顆粒 2 包
飲む回数	1 日 1 回

〔小児〕

体重	30kg 以上	15kg 以上 30kg 未満	7.5kg 以上 15kg 未満	5kg 以上 7.5kg 未満
1 回量 (包数 または錠 数)	120mg 顆粒 4 包 または 240mg 錠 2 錠	120mg 顆粒 2 包 または 240mg 錠 1 錠	120mg 顆粒 1 包	20mg 顆粒 4 包
	シクロスポリ ン（免疫抑制 剤）と併用す る場合： 120mg 顆粒 2 包 または 240mg 錠 1 錠	シクロスポリ ン（免疫抑制 剤）と併用す る場合： 120mg 顆粒 1 包	シクロスポリ ン（免疫抑制 剤）と併用す る場合： 20mg 顆粒 3 包	シクロスポリ ン（免疫抑制 剤）と併用す る場合： 20mg 顆粒 2 包
飲む回数	1 日 1 回			

同種造血幹細胞移植では移植当日から移植後 28 日以内を目安に、臓器移植では移植後早期に開始し、使用期間は、サイトメガロウイルス感染症の発症リスクを考慮しながら、移植後 200 日目まで使用することが目安となります。

●どのように飲むか？

錠剤は、コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

顆粒剤は、できるだけ、ヨーグルトなどのやわらかい食べ物に混ぜて、口から飲んでください。口から飲むことが難しい場合は、顆粒剤を液体に混ぜ、経鼻または胃ろうチューブを通して投与することもできます。詳細は別途お渡しする説明文書を参照し、医師または薬剤師の指示に従ってください。

●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、すぐに 1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は、1 回とばして、次の時間に 1 回分を飲んでください。


●多く使用した時（過量使用時）の対応



異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊娠する可能性のある人は胎児に悪影響を及ぼす可能性があることを十分に理解できるまで説明を受けるとともに、使用中および使用終了後一定期間は適切な避妊をしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	プレバイミス錠 240mg
形状	楕円形のフィルムコーティング錠 
PTP シート	
長径	16.5mm
短径	8.5mm
厚さ	5.2mm
重さ	618mg
色	黄色
識別コード	 591

販売名	プレバイミス顆粒分包 20mg	プレバイミス顆粒分包 120mg
形状	円形のフィルムコーティング顆粒 	
スティック パック		

色	ごく薄い黄赤色
---	---------

【この薬に含まれているのは？】

販売名	プレバイミス錠 240mg
有効成分	レテルモビル
添加剤	結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、乳糖水和物、トリアセチン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

販売名	プレバイミス顆粒分包 20mg	プレバイミス顆粒分包 120mg
有効成分	レテルモビル	
添加剤	結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、乳糖水和物、トリアセチン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄	

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・PTP シート、スティックパックのまま保管し、服用直前に PTP シート、スティックパックから取り出してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD 株式会社 (<https://www.msd.co.jp>)

MSD カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9:00～17:30

（土日祝日・製造販売会社休日を除く）