2026 年 11 月吉日

医療関係者各位

MSD 株式会社

キイジェクト®配合皮下注 395mg／キイジェクト®配合皮下注 790mg 適正使用のお願い

弊社 抗悪性腫瘍剤「キイジェクト®配合皮下注 395mg／キイジェクト®配合皮下注 790mg」（一般名：ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）・ベラヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え））（以下、本剤）につきまして、2026 年 9 月に承認されました。

医療関係者各位におかれましては、患者の安全性確保の観点より、本剤の最新の電子添文、適正使用ガイド†、最適使用推進ガイドライン‡等をご確認いただき、本適応における患者の選択、別添の効能又は効果、用法及び用量、ならびに特に注意すべき副作用など、適正使用へのご協力をお願い申し上げます。

特に本剤を初めて使用される前には、弊社医薬情報担当者が説明いたします適正使用ガイド†を十分ご理解いただくようにお願い申し上げます。

また、本剤は最適使用推進ガイドライン‡に定める施設基準等に合致する場合に使用可能です。このため、医薬情報担当者が施設要件・医師要件を確認させていただくことがございますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

†キイジェクト製品資料：https://www.msdconnect.jp/products/keyject/

‡厚生労働省が発出する資料（革新的医薬品の最適な使用を推進する観点から、必要な医療機関の要件、投与が適切と考えられる患者ならびに投与に際しての留意事項が示されています。）

以上

製品情報お問い合わせ先

MSD カスタマーサポートセンター

医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961

＜受付時間＞9:00～17:30（土日祝日・当社休日を除く）

別添

効能又は効果

1. 悪性黒色腫
2. 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
3. 非小細胞肺癌における術前・術後補助療法
4. 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
5. 根治切除不能な尿路上皮癌
6. がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）
7. 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
8. 腎細胞癌における術後補助療法
9. 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
10. 局所進行頭頸部癌における術前・術後補助療法
11. 根治切除不能な進行・再発の食道癌
12. 治癒切除不能な進行・再発の MSI-High を有する結腸・直腸癌
13. PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌
14. ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法
15. 進行・再発の子宮体癌
16. がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量（TMB-High）を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）
17. 進行又は再発の子宮頸癌
18. 局所進行子宮頸癌
19. 再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型 B 細胞リンパ腫
20. 治癒切除不能な進行・再発の胃癌
21. 治癒切除不能な胆道癌
22. 切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
23. 白金系抗悪性腫瘍剤抵抗性の再発卵巣癌