

## 電子添文改訂のお知らせ

2026年4-5月

アクチビンシグナル伝達阻害剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品<sup>注)</sup>

**エアウィン<sup>®</sup>皮下注用45mg**  
**エアウィン<sup>®</sup>皮下注用60mg**

(ソタテルセプト (遺伝子組換え) 製剤)

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の電子添文を以下のとおり改訂しましたのでお知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。  
弊社製品のご使用にあたって、副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、弊社MRまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

MSD 株式会社

### 《改訂概要》

改訂項目	改訂内容
有効期間	皮下注用45mg：従来の30箇月から36箇月に延長しました。 皮下注用60mg：従来の36箇月から48箇月に延長しました。
11.2 その他の副作用	『心膜液貯留』を追記しました。

- ・ 今回の改訂内容は医薬品安全対策情報 (DSU) No.345 (2026年5月) に掲載されます。
- ・ 改訂後の電子添文全文は、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) 及び弊社ホームページ (<https://www.msconnect.jp/>) に掲載しております。
- ・ 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、PMDAホームページ上の最新の電子添文等をご覧いただけます。

エアウィン皮下注用 (MSD)



(01) 14987 1858 10958

## 《改訂内容》

改訂後				改訂前			
有効期間：36箇月（皮下注用45mg）、 48箇月（皮下注用60mg）				有効期間：30箇月（皮下注用45mg）、 36箇月（皮下注用60mg）			
11. 副作用 11.2 その他の副作用				11. 副作用 11.2 その他の副作用			
	3%以上	3%未満	頻度不明		3%以上	3%未満	頻度不明
	略（変更なし）				略		
眼障害	略（変更なし）			眼障害	略		
心臓障害			心膜液貯留	←追記			
血管障害	略（変更なし）			血管障害	略		
	略（変更なし）				略		

（ ）部：自主改訂

## 《改訂理由》

### 有効期間

安定性試験結果に基づき、皮下注用45mg及び皮下注用60mg両製剤の有効期間を延長しました。

### 11.2 その他の副作用

副作用報告が集積されたことから追記しました。

製品情報お問い合わせ先

**MSD 株式会社**

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12  
ホームページ <https://www.msd.co.jp/>

MSD カスタマーサポートセンター  
医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961  
<受付時間>9:00~17:30（土日祝日・当社休日を除く）

2026年4月  
改訂連絡番号：26-07