


シルガード®9を接種された方へ

HPVワクチン 接種完了証

あなたは、HPVワクチンの接種が完了
いたしました※。

ワクチン接種に加えて、子宮頸^{けい}がん検診
も定期的に受ける必要があることを
忘れないでくださいね。

※：シルガード®9の場合、9歳以上の女性は3回の接種で完了となります。
ただし、9歳以上15歳未満の女性は2回の接種で完了することもできます。



けい 子宮頸がん検診は、どうして必要なの？

子宮頸^{けい}がんの原因となる高リスク型HPVは15種類程度あります¹⁾。今回皆さんが接種したのは、子宮頸^{けい}がんが多く検出される型をカバーしているワクチンですが、他にも高リスク型HPVは存在します。

また、接種時にすでに感染している場合や、すでに進行している病変に対する治療効果はありません^{2、3)}。

接種後も20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸^{けい}がん検診を受けましょう。



1) Muñoz N et al. *N Engl J Med*. 2003; 348: 518-527.

2) Markowitz LE et al. *MMWR Recomm Rep*. 2014; 63(RR-05): 1-30.

3) 日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会 編集・監修 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編. 2023: 52-54.

けい 子宮頸がん検診の内容は？

子宮頸がん検診とは、子宮頸がんになる前の状態（前がん病変）やがん細胞を早期に発見する検査です。

早期治療へつなげるためには定期的な検診が重要です。

検診の種類⁴⁾

子宮頸がん検診には、細胞診検査とHPV検査の2種類があります。どちらも子宮の入り口部分の表面をやわらかいヘラやブラシで軽くこする検査で、1～2分程度で済みます。

●細胞診検査

前がん病変（がんになる前の状態）やがん細胞があるかどうかを確認することができます。

●HPV検査



子宮頸がんの主な原因となるウイルスを検出することができます。ただし、前がん病変やがん細胞の有無についてはわかりません。細胞診検査とHPV検査は両方同時に実施できる場合があります。

結果をうけとったら？

異常が見つかった場合は、必ず精密検査を受けましょう。異常がない場合でも、定期的な検診が大切です。



4) 日本産科婦人科学会 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために「Part 4 HPV検査を含めた子宮頸がん検診について」
<https://www.jsog.or.jp/citizen/5765/> (Accessed Jan. 17, 2025)



ワクチン

検診

子宮頸^{けい}がんの予防には
ワクチンと定期的な検診の2つが大切です

注)子宮頸がんはワクチンと検診で100%予防できるわけではありません