

肺炎球菌結合型ワクチン

バクニューバンス®を接種される方へ

○ワクチンの効果と副反応○

バクニューバンス®は高齢者または肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる成人に接種するワクチンです。このワクチンの接種により15種類の肺炎球菌に対する抗体ができ、これらの種類の肺炎球菌による感染症の予防が期待できます。

ワクチン接種後の主な副反応は、局所反応(痛み、赤み、腫れ、かゆみ)、頭痛、筋肉痛、関節痛、疲労、発熱でした¹⁾。

このほかにも接種後、気になることがあれば医師にご相談ください。

予防接種後に気を付けること

- 接種後しばらくは医療機関内で待機し、体調に変化がないことを確認してください¹⁾。
- 接種当日は、はげしい運動を避けてください^{2,3)}。
- ワクチンを接種した日にお風呂に入っても構いませんが、接種した部位をこすらないように注意しましょう^{2,3)}。
- バクニュバンス[®]接種後、ほかの種類のワクチンを接種する場合は接種の間隔に制限はありません⁴⁾。また、医師が必要と認めた場合は、ほかのワクチンとの同時接種ができます。詳しくは医師にご相談ください。
- 接種後1週間は、体調に注意してください²⁾。

1) 厚生労働省：よくある質問 Q6：

予防接種を受ける前や受けた後には何に気をつければよいの？

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/kihonteki_keikaku/index_00001.html (2026/5/8アクセス)

2) 一般社団法人日本ワクチン産業協会：よぼうせつしゅのはなし 2025：2.

<http://www.wakutin.or.jp/popular/index.html> (2026/5/8アクセス)

3) 一般社団法人日本ワクチン産業協会：

ワクチンについて よ〜くわかる予防接種 Q副反応ってな〜に？

<http://www.wakutin.or.jp/data/mother/vaccination6.html> (2026/5/8アクセス)

4) 厚生労働省：ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou03/rota_index_000003.html (2026/5/8アクセス)

氏 名

接 種 日

年 月 日

Lot No

医療機関名



MSD株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア

<https://www.msd.co.jp/>

2026年5月作成

VNV26PA0001