

关于 B 型肝炎疫苗 (Heptavax®-II) 的接种

在实施 B 型肝炎的预防接种时，必须充分了解被接种者的健康状态。因此，请尽可能详细地填写背面的预诊表。接种者为儿童时，请由充分了解其健康状态的监护人填写。

○疫苗的特点和副作用

本产品为应用基因重组技术生产的 B 型肝炎疫苗。通常，为预防 B 型肝炎要进行三次接种，分别为初次、第一个月（初次接种后 4 周）、第六个月（初次接种后 20~24 周）。

主要的副作用有注射部位疼痛、发红、瘙痒、肿胀、硬结、发热感、发热、倦怠感、手部无力感等。另外，非常罕见的副作用为可能引发休克、过敏反应（血压低下、呼吸困难、面部苍白等）、多发性硬化症、急性播散性脑脊髓炎、脊髓炎、视神经炎、吉兰-巴雷综合征、末梢神经障碍。如果发现什么异常请立即就医。

○不适合接种者

1. 明显正在发烧者。（通常为超过 37.5°C 者）
2. 已明确患有严重的急性疾病者
3. 确认曾因本剂成分（详情请询问医生）而出现过敏反应者
4. 上述所列情况以外，处于不适合预防接种状态者。

○接受接种前，必须要咨询医生者

1. 患有心血管系统疾病、肾脏疾病、肝脏疾病、血液疾病、发育障碍等基础性疾病者
2. 过去接收预防接种时在接种后 2 天以内出现发热者以及出现疑似全身皮疹等过敏症状者
3. 有痉挛既往史者
4. 此前被诊断为免疫缺陷者以及近亲中存在先天性免疫缺陷者
5. 可能因本剂成分（详情请询问医生）出现过敏症状者
6. 怀孕或可能怀孕的女性

○与其他疫苗的同时接种

医生认为需要时，可以与其他疫苗同时接种。

○疫苗接种后的注意事项

1. 接种后 30 分钟可能会出现过敏反应等紧急的副作用，因此请通过留在医疗机构等方式观察情况，以便可以立即就医。
2. 接种当天请避免剧烈运动。（接种当日洗澡也无妨。但是请不要擦洗注射部位。）
3. 虽然接种后有可能会发烧、接种部位肿胀、发红，但是，一般其症状较轻，通常几天就会消失。
4. 接种后应注意自身的健康管理，如果发现出现高烧或身体状况的变化、或是其它局部的异常反应时，请立即就医接受医生的诊疗。

预定接种日	月 日 () 时 分左右	医疗机构名	
-------	------------------	-------	--

[参考]

因接种 B 型肝炎疫苗而导致健康受损时，视情况可依据“医药品副作用被害救济制度”领取治疗费等。

详情请浏览独立行政法人医药品医疗器械综合机构的主页等。

[医药品副作用被害救济制度]

该制度旨在救济虽合理使用医药品却因副作用而患上需要住院治疗的疾病或导致障碍等健康受损的人士，对其进行医疗费、医疗补助、障碍年金等给付。此类情况需要提供医生的诊断书、用药证明等材料。申请救济给付请先咨询医药品医疗器械综合机构。

联系方式如下。

独立行政法人 医药品医疗器械综合机构 医药品副作用受害救济制度咨询窗口

电话：0120-149-931（免费电话）URL：https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

