


# シルガード® 9を 接種された方(保護者の方)へ

2023年4月改訂版



## 目次

はじめに	3
シルガード®9について	4
接種スケジュールについて	5
接種後の注意点	6
副反応について	8
接種後の失神と痛みについて	10
子宮頸がん検診について	12
Q&A	14



本小冊子の内容を動画でもご覧いただけます。



動画を視聴する



## はじめに

9価HPVワクチン シルガード®9は、子宮頸がんや尖圭コンジローマの原因となるヒトパピローマウイルス(Human Papillomavirus: HPV)の感染を予防するワクチンです。

この冊子では、シルガード®9の特徴や副反応について、さらに、HPVワクチン接種とあわせて子宮頸がん予防に大切な、子宮頸がん検診についてご紹介します。

不安に思うことや、もっと知りたいことなどがありましたら、医師など医療関係者にご相談ください。






## シルガード®9について

シルガード®9はヒトパピローマウイルス (HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型の9つ)の感染を防ぐワクチンです。

子宮頸がんや尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス(Human Papilloma-virus: HPV)という、ごくありふれたウイルスの感染が原因で起こることが知られています。

シルガード®9を接種することで、子宮頸がんの原因となるHPVの16、18、31、33、45、52、58型に加え、尖圭コンジローマの原因となるHPVの6、11型に対する抗体がつけられます。

シルガード®9は、これにより子宮頸がんや尖圭コンジローマを予防するワクチンです。



シルガード®9に含まれる9つのHPV型により、日本人の子宮頸がんの原因となるHPV型の88.2%をカバーします<sup>1)</sup>。

シルガード®9に含まれているHPV型以外のHPV感染およびこれらによる病変の発症予防の効果は期待できません。

1) Sakamoto J et al. *Papillomavirus Res.* 2018; 6: 46-51.

## 接種スケジュールについて



シルガード®9は年齢によって  
選択可能な接種回数が異なります。  
事前に医師に接種回数を確認してください。

シルガード®9は、通常腕の筋肉内に注射します。

十分な予防効果が得られるよう、必ず決められた回数・スケジュールで接種してください。

### 9歳以上の女性

9歳以上の女性に、1回0.5mLを  
合計3回、筋肉内に注射します。



### 9歳以上15歳未満の女性

初回接種から6～12ヵ月の間隔を  
置いた合計2回の接種とすることが  
できます。



決められた接種スケジュールで接種ができない場合は、医師に相談しましょう。

1回目にシルガード®9を接種した場合には、その後の接種においてもシルガード®9を接種してください。



## 接種後の注意点

1

接種後にめまいやふらつき、失神などが起こることがあります。倒れないように注意し、すぐに帰宅せずに接種後30分程度は院内にとどまり、体重を預けられるような場所で、イスに座るなど安静にしてください。



2



接種後は、注射部位を清潔に保ってください。

3



接種当日は、過激な運動を控えてください。

4

接種した日に入浴しても問題ありません。ただし、体を洗うときに注射部位を強くこすらないようにしてください。



5



決められた回数の接種が完了しないうちに妊娠した場合は、医師にご相談ください。

6



接種スケジュールを確認し、その後の接種においても初回と同じ種類のHPVワクチンを接種してください。





## 副反応について

シルガード® 9の接種により、  
次のような副反応があらわれることがあります。  
異常が認められた場合は、  
すぐに医師、看護師、薬剤師に相談してください。

一般的にワクチンを接種すると、接種した部位が腫れたり痛むことがあります。これは、体の中でワクチン成分に対する反応が起こるための症状で、通常は数日間程度で治まります。長く続くなど、気になる症状がある場合は医師に相談してください。

### 特に注意が必要な副反応

- ・過敏症反応[アナフィラキシー(頻度不明)、  
気管支痙攣(頻度不明)、蕁麻疹(頻度不明)など]

息切れ(呼吸が苦しいなど)、じんましんなどを症状とする  
重いアレルギー

- ・ギラン・バレー症候群(頻度不明)

手や足に力が入りにくい、手足の感覚が鈍くなるなどを症状とする  
末梢神経の病気

- ・血小板減少性紫斑病(頻度不明)

鼻血や歯ぐきからの出血、あおざなどがみられる病気

- ・急性散在性脳脊髄炎(頻度不明)

発熱、頭痛、手足が動きにくい、歩きにくい、意識の低下などを症状とする  
脳などの神経の病気





【その他の副反応】

頭痛、注射部位の痛み・腫れ・赤み

頻度10%以上



体がふらつくめまい、のどの痛み、悪心(吐き気や胸やけ、胃がむかむかする)、下痢、注射部位のかゆみ・内出血・しこり、発熱、疲れ

頻度1~10%未満



上咽頭炎、インフルエンザ、おう吐、上腹部痛、腹痛、筋肉痛、関節の痛み、注射部位の出血・血腫・熱っぽさ・硬結・知覚低下、注射部位反応、だるさ、無力症(まぶたが下がる、物がだぶって見えるなど)

頻度0.5~1%未満



蜂巣炎(皮ふ局所の痛みと熱を伴った赤い腫れ)、リンパ節の腫れや痛み、感覚の低下、気を失う、手足の痛み、寒気、注射部位の知覚消失

頻度不明





## 接種後の 失神と痛みについて

接種後、30分程度は安静にしてください。  
また、接種後に体調の変化があった場合には、  
すぐに医師に相談してください。

HPVワクチンの接種後に、めまいやふらつき、失神などが起こることがあります。転倒してけがをしないように、次の3つの注意事項を守ってください。

### 3つの注意事項

- 1 接種後に診察室から待合室などへ移動するときには、看護師や保護者などに腕を持って付き添ってもらってください。
- 2 接種後30分程度は、背もたれや肘かけのあるイスなど、体重を預けられるような場所で待っててください。
- 3 待っている間は、なるべく立ち上がることを避け、座ってください。

気分が悪くなったり、めまいを感じたら、転倒しないようにイスにもたれかかる、しゃがむ、横になるなどして、すぐに受付や看護師、医師に知らせてください。

### 接種後にふらつきや失神が起こる理由

注射を打ったときの痛み、恐怖、興奮などによる刺激が脳神経のひとつである迷走神経を介して中枢に伝わり、心拍数や血圧が下がったりすることがあります。そのため、気分が悪くなったり、めまいやふらつき、失神などが起こります。これは、血管迷走神経反射とよばれ、多くの場合、注射後の失神が起こる原因と考えられています。血管迷走神経反射は思春期の女性に多いという報告があります。特に注射への恐怖心が強い方は注意が必要です。



## 痛みやしびれ、動かしにくさ、<sup>ふ</sup>不<sup>ずい</sup>随意<sup>い</sup>運動<sup>うんどう</sup>について

- ワクチンの接種を受けた後に、広い範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと)などを中心とする多様な症状が起きたことが報告されています。
- この症状は専門家によれば「機能的な身体症状」(何らかの身体症状はあるものの、画像検査や血液検査を受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態)であると考えられています。
- 症状としては、①知覚に関する症状(頭や腰、関節等の痛み、感覚が鈍い、しびれる、光に対する過敏など)、②運動に関する症状(脱力、歩行困難、不随意運動など)、③自律神経等に関する症状(倦怠感、めまい、睡眠障害、月経異常など)、④認知機能に関する症状(記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など)などいろいろな症状が報告されています。
- 「HPVワクチン接種後の局所の疼痛や不安等が機能的な身体症状をおこすきっかけとなったことは否定できないが、接種後1ヵ月以上経過してから発症している人は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しい」と専門家によって評価されています。
- また、同年代のHPVワクチン接種歴のない方においても、HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する方が一定数存在することが明らかとなっています。
- このような「多様な症状」の報告を受け、様々な調査研究が行われていますが、「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。
- ワクチンの接種を受けた後や、けがの後などに原因不明の痛みが続いたことがある方は、これらの状態が起きる可能性が高いと考えられているため、接種については医師とよく相談してください。

厚生労働省「小学校6年～高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ」(詳細版)  
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf> (Accessed Mar. 13, 2023)

ワクチン接種後の「多様な症状」の発現状況については、これまでの臨床試験結果からでは判断できない点もあるため、今後さらに調査を行い、確認していく予定です。



## けい 子宮頸がん検診※について

※国の指針としては、20歳以上の女性において、2年に1回の受診が推奨されています。


シルガード®9は子宮頸がんを100%予防できるわけではありません。  
シルガード®9の接種とあわせて、20歳を過ぎたら子宮頸がんの早期発見、  
早期治療のために、定期的に子宮頸がん検診を受けるようにしましょう。

## 日本は他国に比べて、子宮頸がんの 定期検診受診率がとても低い状況です。

世界の各国では、子宮頸がん予防への意識が高く、アメリカやドイツでは約80%の女性が定期的に検診を受けています。今や先進国では子宮頸がん検診は、多くの女性に必要な検診と捉えられています。

### 世界各国の子宮頸がん検診受診率 (OECD加盟国における20~69歳の女性)

2019年(日本)あるいは直近のデータに基づく(数値は四捨五入して表示)



厚生労働省 2019年 国民生活基礎調査の概況  
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/04.pdf> (Accessed Mar. 13, 2023)  
公益財団法人 がん研究振興財団 がんの統計 2022 より作成

## 子宮頸<sup>けい</sup>がん予防

HPVワクチン  
接種



子宮頸<sup>けい</sup>がん検診



注)シルガード®9の接種とあわせて、20歳を過ぎたら定期的に子宮頸<sup>けい</sup>がん検診を受けるようにしましょう。



## Q&A



**Q** 接種のスケジュールが遅れてしまいましたが、どうすればよいでしょうか？

**A** 気づいた時点でなるべく早く接種して、その後のスケジュールを継続してください。最初から接種をやり直す必要はありません。

**Q** 年齢によって選択できるワクチンの接種回数は異なりますか？

**A** シルガード®9は3回接種することでHPV感染を防ぐために必要な免疫が得られることがわかっています。一方で、9歳以上15歳未満の女性では初回接種から6～12ヵ月の間隔を置いて2回目の接種を行うことでも十分な免疫が得られることがわかっていますので、2回接種を選択することも可能です。

**Q** シルガード®9の接種を完了したので、もう検診は受けなくてもよいでしょうか？  
また、これで一生、子宮頸がんや尖圭コンジローマにはなりませんか？

**A** たとえワクチンを接種しても、子宮頸がんや尖圭コンジローマを100%予防できるわけではありません。20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸がん検診を受けてください。

**Q** 決められた回数のシルガード®9の接種を完了する前に妊娠が判明しました。どうすればよいでしょうか？

**A** 決められた回数の接種を完了する前に妊娠が判明した場合は、医師にご相談のうえ、次の接種を出産後まで延期してください。

**Q** シルガード®9を接種することで、子どもができにくくなるということはありませんか？

**A** シルガード®9の接種によって子どもができにくくなるという報告はありません。

**Q** 接種を予定した日に風邪を引いてしまいましたが、接種はできますか？

**A** 体調が極めてよくないとき、熱が37.5℃以上あるときは、シルガード®9の接種はできません。医師にご相談のうえ、体調が回復してから接種してください。

**Q** インフルエンザなど、他の予防接種を受けようと思っています。気をつける点はありますか？

**A** 他のワクチンを接種する場合、あるいはすでに他のワクチンを接種済みの場合は医師にご相談ください。



## ホームページ

ワクチンを  
接種したら  
必ず予防  
できるの？



子宮頸がんのこと、  
もっと知りたいけど  
詳しい情報は  
ないかな？

## もっと知りたい 子宮頸がん予防

HPVワクチン接種や、子宮頸がん<sup>けい</sup>予防に役立つ情報を詳しく紹介しています。



もっと知りたい 子宮頸がん予防  
<https://www.shikyukeigan-yobo.jp/>






## シルガード®9接種記録カード

接種スケジュールを記入し、シルガード®9の接種完了にお役立てください。

- 接種後、気になる症状があるときは医師にご相談ください。
- 予防効果を得るためには決められた回数（3回もしくは2回）接種する必要があります。
- 1回目にシルガード®9を接種した場合は、それ以降もシルガード®9を接種してください。
- 決められた回数の接種を完了する前に妊娠が判明した場合は、接種を見合わせ、その後の接種については医師にご相談ください。
- 20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸がん検査を受けましょう。

## シルガード®9 接種記録カード



## シルガード®9接種記録カード

接種スケジュールを記入し、シルガード®9の接種完了にお役立てください。

医療機関名

氏名

9歳以上の女性は、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射します。通常、2回目は初回接種の2か月後、3回目は6か月後に同様の用法で接種しますが、9歳以上15歳未満の女性は、初回接種から6～12か月の間隔を置いた合計2回の接種とすることができます。

		3回接種		
		2回目接種	2回目	3回目
接種予定日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
接種日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
ロット番号				

## 接種スケジュール