

## ピフェルトロ錠 100mg

### 【この薬は？】

販売名	ピフェルトロ錠 100mg PIFELTRO Tablets 100mg
一般名	ドラビリン Doravirine
含有量 (1錠中)	100mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- この薬は、抗ウイルス剤（非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤）と呼ばれるグループに属する薬です。
- この薬は、HIV-1（ヒト免疫不全ウイルス1型）の逆転写酵素を阻害して、ウイルスの増殖をおさえます。
- 次の病気の人に処方されます。

#### **HIV-1 感染症**

- この薬は、他の抗HIV薬と併用されます。
- この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止すると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・次の薬や食品を使用している人  
カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、エンザルタミド、リファンピシン、ミトタン、セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort : セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品
  - ・過去にピフェルトロ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- この薬には併用してはいけない薬や食品 [カルバマゼピン (テグレート)、フェノバルビタール (フェノバル)、フェニトイン (アレビアチン)、ホスフェニトイン (ホストイン)、エンザルタミド (イクスタンジ)、リファンピシン (リファジン)、ミトタン (オペプリム)、セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品]、併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬を使用する前に薬剤耐性検査 (薬が効くかどうかの検査) を行うことがあります。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。  
通常、成人は、食事の有無にかかわらず1日1回1錠を飲みます。  
リファブチンを併用する場合は、1日2回に増量されます。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時 (過量使用時) の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬は、患者さんやそれに代わる適切な人が以下の点について十分に理解できるまで説明を受け、同意してから使用が開始されます。
  - ・この薬は、H I V感染症を根本的に治すものではありません。この薬を飲んでいても、病気が進行する可能性がありますので、この薬を飲んでいる間の身体状況の変化はすべて医師に報告してください。
  - ・この薬を長く飲んだ場合の影響については、わかりません。
  - ・医師の処方どおりに毎日飲んでください。医師に相談しないでこの薬の量




を変更したり、やめたりしないでください。

- 他の薬を飲んでいるときには、そのことを医師に教えてください。また、新たに他の薬を使い始める場合はあらかじめ医師に相談してください。
- この薬を含めて、H I V感染症の薬を飲み始めた後、免疫力が回復し、日和見感染などに対する炎症反応（発熱、下痢など）があらわれたり、悪化したり、自己免疫疾患\*（甲状腺機能亢進症、多発性筋炎、ギラン・バレー症候群、ブドウ膜炎など）があらわれたりすることがあります。

\*自分自身の正常な細胞や組織に対して過剰な免疫反応が起こるため発症する疾患

- 妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- 授乳を避けてください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 【この薬の形は？】

形状	楕円形のフィルムコーティング錠 
ボトル	
直径	長径：19.0mm、短径：9.5mm
厚さ	7.1mm
色	白色
識別コード	 700

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ドラビリン
添加剤	ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、トリアセチン、カルナウバロウ

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・湿気を避けるため、瓶のまま密栓して保管し、常に乾燥剤を入れておいてください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD株式会社 (<https://www.msdl.co.jp>)

MSDカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9:00～17:30

（土日祝日・製造販売会社休日を除く）