

## シベクトロ点滴静注用 200mg

### 【この薬は？】

販売名	シベクトロ点滴静注用 200mg Sivextro for iv infusion 200mg
一般名	テジゾリドリン酸エステル Tedizolid Phosphate
含有量	200mg (1バイアル中 210mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、オキサゾリジノン系合成抗菌剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、感染症の原因となる細菌の増殖を抑制し、炎症症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### <適応症>

深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、  
びらん・潰瘍の二次感染

#### <適応菌種>

テジゾリドに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にシベクトロ点滴静注用に含まれる成分に対して過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・好中球減少症（好中球数が  $1,000/\text{mm}^3$  未満）の人
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人
- 過去に抗生物質等でアレルギーをおこしたことがある人は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。

## 【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

### ●使用量および回数

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において注射されます。
- ・通常、成人の使用する量および回数は、次のとおりです。

一回量	200mg
使用回数	1日1回、1時間かけて点滴静注する

- ・グラム陰性菌等を含む複合感染症の場合やこれらが疑われる場合は他の抗菌薬と併用されます。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- 妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- 授乳している人は医師に相談してください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
偽膜性大腸炎 ぎまくせいだいちょうえん	腹痛、血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る、発熱、頭痛、吐き気、冷汗が出る、顔面蒼白（そうはく）、手足が冷たくなる
可逆的な貧血・白血球減少・汎血球減少・血小板減少等の骨髄抑制 かぎやくてきなひんけつ・はつけっきゆうげんしょう・はんけつきゆうげんしょう・けっしょうばんげんしょうと	体がだるい、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、突然の高熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血しやすい、発熱、出血が止まりにくい、頭が重い

重大な副作用	主な自覚症状
うのこつずいよくせい	
代謝性アシドーシス たいしゃせいアシドーシス	頭痛、眠くなる、意識の低下、深く大きい呼吸
視神経症 ししんけいしょう	視力の低下、中心部が見づらい、目のかすみ、目を動かすと痛い

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、冷汗が出る、出血が止まりにくい、寒気、突然の高熱、出血しやすい、体がだるい
頭部	頭痛、頭が重い、めまい、眠くなる、意識の低下
顔面	顔面蒼白、鼻血
眼	視力の低下、中心部が見づらい、目のかすみ、目を動かすと痛い
耳	耳鳴り
口や喉	吐き気、歯ぐきの出血、喉の痛み
胸部	動悸、息切れ、深く大きい呼吸
腹部	腹痛
手・足	手足が冷たくなる
皮膚	あおあざができる
便	血の混ざったゆるい便が出る、ゆるい便が出る

## 【この薬の形は？】

形状	
性状	白色～僅かに黄色の凍結乾燥製剤

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	テジゾリドリン酸エステル
添加剤	D-マンニトール、pH 調整剤

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：MSD 株式会社 (<http://www.msd.co.jp>)

MSD カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル：0120-024-964

受付時間：9:00～17:30

(土日祝日・製造販売会社休日を除く)