

肺炎球菌ワクチン

ニューモバックス[®]NPを 接種される方へ



肺炎予防.jp

成人の肺炎予防に関するウェブサイト

<https://www.haien-yobou.jp/>



予防接種後に気を付けること

- 接種後しばらくは医療機関内で待機し、体調に変化がないことを確認してください¹⁾。
- 接種当日は、はげしい運動を避けてください^{2、3)}。
- ワクチンを接種した日にお風呂に入っても構いませんが、接種した部位をこすらないように注意しましょう^{2、3)}。
- 接種後1週間は、体調に注意してください²⁾。

1)厚生労働省:よくある質問

Q6:予防接種を受ける前や受けた後には何に気をつければよいの?

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kihonteki_keikaku/index_00001.html#Q6
(2025年4月10日アクセス)

2)一般社団法人日本ワクチン産業協会:よぼうせつしゅのはなし 2025:2-3.

<http://www.wakutin.or.jp/popular/index.html>(2025年4月10日アクセス)

3)一般社団法人日本ワクチン産業協会:ワクチンについて


よ〜くわかる予防接種 Q副反応ってな〜に?

<http://www.wakutin.or.jp/data/mother/vaccination6.html>
(2025年4月7日アクセス)

肺炎球菌ワクチンを追加接種・再接種する場合の接種間隔

ニューモバックス[®]NP以外の肺炎球菌ワクチン(結合型ワクチン)の追加接種

ニューモバックス[®]NP接種から1年以上の間隔を空けることが推奨されています¹⁾。



ニューモバックス[®]NPの再接種

5年以内に再接種を行うと、注射部位の痛みや腫れが強くなる場合があります^{2、3)}。そのため、前回から5年以上の間隔を空ける必要があります⁴⁾。



1)日本呼吸器学会 感染症・結核学術部会ワクチンWG/

日本感染症学会ワクチン委員会/日本ワクチン学会・合同委員会.

65歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方(第7版 2025年9月30日)

2)Borgono JM, et al. *Proc Soc Exp Biol Med.* 1978;157(1):148-154.

3)Musher DM, et al. *J Infect Dis.* 2010;201(4):516-524.

4)一社)日本感染症学会 肺炎球菌ワクチン再接種問題検討委員会.感染症学雑誌
2017;91(4):543-552.

肺炎球菌ワクチンには、複数種類があります。
種類によって接種間隔が異なります。
次回のワクチンの接種を希望する際は、医師にご相談ください。

23価肺炎球菌ワクチン接種済カード



このカードはなくさないように、
保管してください。



副反応

ワクチン接種後の主な副反応は、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れ、など)や、頭痛、筋肉痛、発熱などがあります¹⁾。

このほかにも接種後、気になることがあれば医師にご相談ください。

1)ニューモバックス®NPシリンジ電子添文 2025年10月改訂(第5版)



MSD株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア
<https://www.msd.co.jp/>

2026年3月作成
PMV26PA0001



氏名	
接種日	年 月 日
次回の肺炎球菌ワクチン接種可能日	結合型ワクチンの場合： 年 月 日以降 (1年以上の接種間隔が推奨されています)
	23価肺炎球菌ワクチンの場合： 年 月 日以降 (5年以上の接種間隔が必要です)
接種施設名	